

AIRS®とは？

血液中のアミノ酸濃度バランスの変動に着目し、AIRS®は**1回の採血（5ml程度）**により**現在がんである可能性（男性5種、女性6種）**を評価するアミノインデックス®がんリスクスクリーニング（AICS®）と**4年以内に糖尿病になるリスク**を評価するアミノインデックス®生活習慣病リスクスクリーニング（AILS®）を一度に評価します。

◎AIRS®の対象と検査前の注意事項

検査項目		評価項目	評価内容	対象年齢*
男性 AIRS®	AICS®	男性AICS（5種）	現在がんである可能性 対象となるがん種：胃がん、肺がん、大腸がん、 膵臓がん、前立腺がん	25～90歳 (前立腺がんは40～90歳)
	エー・アイ・エル・エス AILS®	AILS（糖尿病リスク） **	4年以内に糖尿病を発症するリスク	20～80歳
		AILS（アミノ酸レベル）	血液中の必須・準必須アミノ酸の低さ	
女性 AIRS®	AICS®	女性AICS（6種）	現在がんである可能性 対象となるがん種：胃がん、肺がん、大腸がん、 膵臓がん、乳がん、子宮がん・卵巣がん***	25～90歳 (子宮がん・卵巣がんは20～80歳)
	エー・アイ・エル・エス AILS®	AILS（糖尿病リスク） **	4年以内に糖尿病を発症するリスク	20～80歳
		AILS（アミノ酸レベル）	血液中の必須・準必須アミノ酸の低さ	

食事

検査前の8時間は
水以外は



検査前の8時間は、水以外（食事、サプリメント等）は摂らないで、午前中に採血してください。検査前日の夕食も、肉、魚などの高たんぱく質の食事は摂りすぎないようにしてください。

運動

当日朝は



正しい検査結果を得るために、検査当日朝の運動はお控えください。



お薬

事前に
相談を



薬剤のAICS値への影響に関しては分かっておりません。検査当日のお薬の服用方法については、事前に主治医または検診施設にご相談の上、その指示に従ってください。

受診対象外

検査時に妊娠されている方、授乳中の方、がん患者（治療中を含む）の方、先天性代謝異常の方、透析患者の方は、検査結果に影響がありますので検査は受けられません。

がんリスク+生活習慣病リスクAIRS検査料金 ⇒ ￥23,000(税別)

国家公務員共済組合連合会 吉島病院

広島市中区吉島東3丁目2番33号

電話番号

082-241-2167(代表)
健康管理センター
または 主治医へ